

# Anexo 1

## Capítulo 3- PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À SÍNDROME NEFRÓTICA:

Tabela 1- Perfil lipídico: valores de referência para crianças e adolescentes (mg/dL):

<b>Categoria</b>	<b>Aceitável</b>	<b>Limítrofe</b>	<b>Elevado</b>
CT	< 170	170-199	≥200
LDL-C	<110	110-129	≥130
Não-HDL-C	<120	120-144	≥145
TG			
0-9 anos	<75	75-99	≥100
10-19anos	<90	90-129	≥130
<b>Categoria</b>	<b>Aceitável</b>	<b>Limítrofe</b>	<b>Baixo</b>
HDL-C	>45	45-40	<40

Fonte: AAP,2011.

Tabela 2-Valores séricos do perfil lipídico para crianças acima de 2 anos e adolescentes:

<b>Lipoproteínas (mg/dL)</b>	<b>Desejáveis</b>	<b>Limítrofes</b>	<b>Elevados</b>
CT	< 150	150-169	>170
LDL-C	<100	100-129	>130
Não-HDL-C	>45	---	---
TG	<100	100-129	>130

Fonte: Giuliano IBC et al,2005.

### BIBLIOGRAFIA:

VER CAPÍTULO "COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À SÍNDROME NEFRÓTICA".