



Fonte: Modificado de: Diário Miccional do Hospital dos Servidores do Estado do RJ- Serviço de Pediatria- Setor de Urodinâmica Pediátrica e Distúrbios da Micção.

## Escala de Bristol para Obstipação

<b>Tipo 01</b>		Pedacos separados, duros como amendoim
<b>Tipo 02</b>		Forma de salsicha, mas segmentada
<b>Tipo 03</b>		Forma de salsicha, mas com fendas na superfície
<b>Tipo 04</b>		Forma de salsicha ou cobra, lisa e mole
<b>Tipo 05</b>		Pedacos moles, mas contornos nítidos
<b>Tipo 06</b>		Pedacos aerados, contornos esgarçados
<b>Tipo 07</b>		Aquosa, sem peças sólidas


Fonte: <http://www.natiris.pt/wp-content/uploads/2017/08/escala-bristol.jpg>

## Critério de Roma IV: diagnóstico de constipação funcional em crianças.

Dois dentre os critérios abaixo, pelo uma vez por semana, com pelo menos um mês de duração, em crianças com desenvolvimento igual ou maior ao esperado para quatro anos de idade:

- Duas ou menos evacuações por semana
- Pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana
- História de postura retentiva ou excessiva retenção fecal
- História de evacuação dolorosa ou difícil
- Presença de massa fecal palpável no reto
- Relato de fezes de grosso calibre capazes de obstruir o vaso sanitário

Figura 1- Padrão normal de curva de fluxo da Urofluxometria. Formato em sino.



Fonte: Fonseca E, 2013.

BIBLIOGRAFIA:  
VER CAPÍTULO "DISFUNÇÃO DO TRATO URINÁRIO NA INFÂNCIA".